

<b>LISTADO DE ELEMENTOS CLAVE IDENTIFICADOS EN CALAMOCARRO-BENZÚ</b>
<b>HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO</b>
1210. Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados
1230. Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas.
4030. Brezales secos europeos
5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
6110*. Prados calcáreos cársticos o basófilos del <i>Alysso-Sedion albi</i>
6430. Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
7220*. Manantiales petrificantes con formación de tuf ( <i>Cratoneurion</i> )
8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
92A0. Bosques galería de <i>Salix alba</i> y <i>Populus alba</i>
92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> y <i>Securinegion tinctoriae</i> )
9330. Bosques de <i>Quercus suber</i>
9540. Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
<b>ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO</b>
<i>Cerambyx cerdo</i> ssp. <i>mirbeckii</i>
<i>Mauremys leprosa</i>
<i>Testudo graeca</i>
<i>Miniopterus schreibersii</i>
<i>Myotis capaccinii</i>
<i>Myotis punicus</i> (antes identificado como <i>Myotis blythii</i> )
<i>Rhinolophus blasii</i>
<i>Rhinolophus euryale</i>
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
<i>Rhinolophus hipposideros</i>
<i>Rhinolophus mehelyi</i>
<b>AVES ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES</b>
<i>Alectoris barbara</i>
<i>Buteo rufinus</i> ssp. <i>cirtensis</i>
<i>Egretta garzetta</i> ssp. <i>garzetta</i>
<i>Galerida theklae</i> ssp. <i>erlangeri</i>
<i>Sterna sandvicensis</i>
<i>Sylvia undata</i> ssp. <i>toni</i>
<b>OTROS ELEMENTOS</b>
<i>Rupicapra africana</i> ssp. <i>decepiens</i>
<i>Patella ferruginea</i>
<i>Salamandra algira</i>
Arboledas y árboles singulares